

Ситуаційні завдання для перевірки лекційного матеріалу

Ситуаційне завдання 1. Чоловік К., 23 років, був у статевому контакті з жінкою, якій було встановлено діагноз Ранній прихований сифіліс. З моменту контакту пройшло близько 10 діб. Порекомендуйте чоловіку курс превентивної терапії, який можна отримати амбулаторно.

Ситуаційне завдання 2. Хворому К., 23 років, було встановлено діагноз Первинний серопозитивний сифіліс. Порекомендуйте хворому схему специфічної фармакотерапії, якщо з моменту зараження пройшло близько 2,5 місяця.

Ситуаційне завдання 3. Хворому К., 23 років, було встановлено діагноз Вторинний рецидивний сифіліс. Порекомендуйте хворому схему специфічної фармакотерапії, якщо з моменту зараження пройшло 5 місяців.

Ситуаційне завдання 4. Хворому К., 23 років, було встановлено діагноз Первинний серопозитивний сифіліс. Хворий має алергічну реакцію на препарати групи пеніцилінів. Порекомендуйте хворому для специфічної фармакотерапії антибіотики резерву із групи макролідів.

Ситуаційне завдання 5. Вагітній П., 22 років, в другій половині вагітності було встановлено Ранній прихований сифіліс. Порекомендуйте схеми специфічної фармакотерапії сифілісу у вагітній.

Ситуаційне завдання 6. Хворому К., 25 років, було встановлено діагноз Свіжа гостра неускладнена гонорея. Порекомендуйте хворому схему антибактеріальної терапії препаратами групи пеніцилінів.

Ситуаційне завдання 7. Хворому К., 25 років, було встановлено діагноз Свіжа гостра неускладнена гонорея. Хворий має алергічну реакцію на препарати групи пеніцилінів. Порекомендуйте хворому схему антибактеріальної терапії препаратами групи макролідів.

Ситуаційне завдання 8. Хворому К., 25 років, було встановлено діагноз Свіжа гостра неускладнена гонорея. Порекомендуйте хворому схему антибактеріальної терапії препаратами групи цефалоспоринів.