

## Ситуаційні завдання для перевірки лекційного матеріалу

**Ситуаційне завдання 1.** Хворий, 25 років, встановлено діагноз: Гострий неускладнений пієлонефрит середнього ступеня. Порекомендуйте хворий емпіричну антибактеріальну терапію.

**Ситуаційне завдання 2.** Хворий, 25 років, встановлено діагноз: Гострий неускладнений пієлонефрит середнього ступеня. Порекомендуйте хворий емпіричну антибактеріальну терапію альтернативними препаратами.

**Ситуаційне завдання 3.** Хворий, 45 років, встановлено діагноз: Гострий неускладнений пієлонефрит тяжкий перебіг. Порекомендуйте хворий емпіричну антибактеріальну терапію, якщо в регіоні високий рівень резистентності до фторхінолонів та наявністю  $\beta$ -лактамаз-продукуючої *E. coli* (> 10 %).

**Ситуаційне завдання 4.** У вагітній, 30 років, 15 тижнів вагітності, встановлено діагноз: Гострий пієлонефрит середньої тяжкості перебіг. Порекомендуйте вагітній емпіричну антибактеріальну терапію.

**Ситуаційне завдання 5.** Хворий, 25 років, встановлено діагноз: Гострий неускладнений цистит. Порекомендуйте хворий емпіричну антибактеріальну терапію

**Ситуаційне завдання 6.** Хворий, 25 років, встановлено діагноз: Гострий цистит. Порекомендуйте хворий симптоматичну терапію при наявності ознак макрогематурії.

**Ситуаційне завдання 7.** Хворий, 25 років, встановлено діагноз: Гострий неускладнений цистит. Порекомендуйте хворий препарати для усунення спазмів та больового синдрому.

**Ситуаційне завдання 8.** Хворому, 45 років, який страждає на хронічний гломерулонефрит протягом 15 років, встановлено діагноз: Хронічна ниркова недостатність II ступеня. Порекомендуйте хворому препарати із групи інгібіторів АПФ для корекції підвищеного тиску та протеїнурії.

**Ситуаційне завдання 9.** Хворому, 45 років, який страждає на хронічний гломерулонефрит протягом 15 років, встановлено діагноз: Хронічна ниркова недостатність II ступеня. Порекомендуйте хворому препарати із групи блокаторів рецепторів ангіотензину II для корекції підвищеного тиску та протеїнурії.

**Ситуаційне завдання 10.** Хворому, 45 років, який страждає на хронічний гломерулонефрит протягом 15 років, встановлено діагноз: Хронічна ниркова недостатність II ступеня. Порекомендуйте хворому препарати для корекції анемії, обумовленої зниженням рівню еритропоетину, якщо рівень гемоглобіну складає  $Hb > 90$  г/л.

**Ситуаційне завдання 11.** Хворому, 45 років, який страждає на хронічний гломерулонефрит протягом 15 років, встановлено діагноз: Хронічна ниркова недостатність II ступеня. Порекомендуйте хворому ентеросорбенти для корекції гіперазотемії.

**Ситуаційне завдання 12.** Хворому, 45 років, який страждає на хронічний гломерулонефрит протягом 15 років, встановлено діагноз: Хронічна ниркова недостатність II ступеня. Порекомендуйте хворому препарати для корекції гіперфосфатемії, якщо хворий знаходиться на гемодіалізі, не приймає фосфат-зв'язуючі препарати та рівень фосфату в сироватці крові визначається 2,12 ммоль/л.

**Відповідь.** Рекомендовано севеламер (Ренагель) в початковій дозі 1 табл. (800 мг)