

Ситуаційні завдання для перевірки самостійної роботи студента

Ситуаційне завдання 1. У хворій В., 23 років, був встановлений діагноз Пухирцевий лишай. Порекомендуйте хворій місцеву терапію протівірусними засобами.

Ситуаційне завдання 2. У хворій В., 23 років, був встановлений діагноз Рецидивуючий генітальний герпес. Порекомендуйте хворій системну терапію протівірусними засобами, якщо частота рецидивів до 4 разів на рік.

Ситуаційне завдання 3. У хворій В., 23 років, був встановлений діагноз Рецидивуючий генітальний герпес. Порекомендуйте хворій системну терапію протівірусними засобами, якщо частота рецидивів до 10 разів на рік.

Ситуаційне завдання 4. У хворій В., 43 років, був встановлений діагноз Оніхомікоз стоп. В зішкрібі з нігтьових пластинок стоп виявлено міцелій грибка. Порекомендуйте хворій схему фармакотерапії системними протигрибковими засобами.

Ситуаційне завдання 5. Хворій Х. встановлений діагноз: Розповсюджений кандидоз слизових оболонок. Вкажіть яку системну антифунгальну фармакотерапію слід рекомендувати хворій для прийому всередину.

Ситуаційне завдання 6. Хворій Ю. встановлений діагноз: Кандидоз шкіри з наявністю гострозапальних проявів. Вкажіть які комбіновані мазі, що містять триамцінолону ацетонід та мірамістин, слід рекомендувати хворій.

Ситуаційне завдання 7. Хворому Д. встановлений діагноз: Кандидоз шкіри з наявністю гострозапальних проявів. Вкажіть які протигрибкові мазі слід рекомендувати хворому для зовнішньої фармакотерапії.

Ситуаційне завдання 8. Хворій З. встановлений діагноз: Вагінальний трихомоніаз. Вкажіть які препарати вибору для прийому всередину слід рекомендувати хворій.

Ситуаційне завдання 9. Хворій Р. встановлений діагноз: Вагінальний трихомоніаз. Вкажіть яку вагінальну фармакотерапію слід рекомендувати хворій з похідних імідазолу:

Ситуаційне завдання 10. Хворій А. встановлений діагноз: Вагінальний трихомоніаз. Вкажіть яку вагінальну фармакотерапію слід рекомендувати хворій з групи хлорхінальдону.

Ситуаційне завдання 11. Вагітній (16 неділь) Ф. встановлений діагноз: Вагінальний трихомоніаз. Вкажіть який препарат вибору слід рекомендувати вагітній для місцевої фармакотерапії.

Ситуаційне завдання 12. Хворій Л. встановлений діагноз: Вагінальний трихомоніаз. Вкажіть які схеми фармакотерапії метронідазолом можна рекомендувати хворій для перорального прийому.