

Ситуаційні завдання для підготовки до практичного заняття

Ситуаційне завдання 1. Хворому С. 32 р. встановлено діагноз: Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром. Який препарат з групи антиагрегантів можна застосовувати для поліпшення мікроциркуляції в клубочках нирок?

Ситуаційне завдання 2. Хворому С., 32 р., встановлено діагноз: Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром. Які препарати з групи непрямих антикоагулянтів можна застосовувати для поліпшення мікроциркуляції в клубочках нирок?

Ситуаційне завдання 3. Хворій С. 36 р. встановлено діагноз: Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, артеріальна гіпертензія. Яку групу антигіпертензивних препаратів необхідно застосувати для корекції артеріального тиску та протеїнурії (вказіть препарати, дози)?

Ситуаційне завдання 4. Хворій С. 36 р. встановлено діагноз: Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, артеріальна гіпертензія, ХНН II ст. Яку групу антигіпертензивних препаратів необхідно додати до інгібіторів АПФ для корекції артеріального тиску та протеїнурії хворому з порушенням функції нирок (вказіть препарати, дози)?

Ситуаційне завдання 5. Хворому А. встановлено діагноз: Неспецифічний уретрит. Загальний стан пацієнта задовільний. Вкажіть які препарати з групи фторхінолонів слід рекомендувати хворому амбулаторно для проведення етіотропної терапії.

Ситуаційне завдання 6. Хворому Ж. встановлено діагноз: Неспецифічний уретрит. Загальний стан пацієнта задовільний. Хворий місяць назад приймав офлоксацин. Вкажіть які препарати слід рекомендувати хворому амбулаторно для проведення етіотропної терапії.

Ситуаційне завдання 7. Хворому К. встановлено діагноз: Гострий неспецифічний уретрит. Хворий потребує стаціонарного лікування. Хворий місяць назад приймав *офлоксацин* (Зофлоркс, Заноцин, Таривид) і має алергічну реакцію на пеніциліни. Вкажіть які препарати слід рекомендувати хворому для проведення етіотропної терапії.

Ситуаційне завдання 8. Хворого Ю. госпіталізовано в стаціонар з діагнозом: Гострий неспецифічний уретрит. Вкажіть якими препаратами уроантисептиків (пероральним прийомом) слід рекомендувати доповнити антибактеріальну терапію хворому.

Ситуаційне завдання 9. Хворому Ш. встановлено діагноз: Неспецифічний уретрит підгострий період. Вкажіть яку місцеву фармакотерапію слід рекомендувати хворому.

Ситуаційне завдання 10. Хворого Г. було прооперовано з приводу сечокам'яної хвороби. Вкажіть які ферментативні препарати слід рекомендувати хворому для підвищення протеолітичної активності сечі, якщо її рН 5,7 (кисла).

Ситуаційне завдання 11. Хворій А. встановлено діагноз: Сечокам'яна хвороба. При клінічному дослідженні сечі: рН сечі 5,0. Вкажіть яку фармакотерапію слід рекомендувати хворій для корекції рН сечі, для розчинення сечокислих каменів та запобіганню їх новоутворенню.

Ситуаційне завдання 12. Хворій А. встановлено діагноз: Сечокам'яна хвороба. При клінічному дослідженні сечі: рН сечі кисла. Вкажіть яку фармакотерапію слід рекомендувати хворій для корекції рівня сечової кислоти сироватки крові на фоні проведення корекції рН сечі.

Ситуаційне завдання 13. Хворій А. встановлено діагноз: Сечокам'яна хвороба. При клінічному дослідженні сечі виявлені оксалатні солі. Вкажіть яку фармакотерапію слід рекомендувати хворій для розчинення оксалатних каменів та запобіганню їх новоутворенню.

Ситуаційне завдання 14. Хворій В. встановлено діагноз: Сечокам'яна хвороба. При клінічному дослідженні сечі: рН сечі 7,2, виявлені фосфатні солі. Вкажіть яку фармакотерапію слід рекомендувати хворій для розчинення фосфатних каменів та запобіганню їх новоутворенню.

Ситуаційне завдання 15. Хворій М. встановлено діагноз: Сечокам'яна хвороба, цистинові камені. Вкажіть яку фармакотерапію слід рекомендувати хворій для розчинення цистинових каменів та запобіганню їх новоутворенню.