

## **Ситуаційні завдання для підготовки до практичного заняття за темою «Фармакотерапія захворювань органів дихання»**

**Ситуаційне завдання 1** Хворому З. встановлений діагноз ХОЗЛ А, легка ступінь обструкції, стадія нестійкої ремісії. ЛН I. Вкажіть які препарати першої лінії рекомендувати хворому для фармакотерапії ХОЗЛ.

**Ситуаційне завдання 2** Хворому А. встановлений діагноз ХОЗЛ А, легка ступінь обструкції, стадія загострення. ЛН I. Хворий отримує фенотерол (Беротек) у дозі 2 інгаляції 3рази на добу. Вкажіть яку фармакотерапію другої лінії можна рекомендувати хворому.

**Ситуаційне завдання 3** Хворому Д. встановлений діагноз ХОЗЛ В, середня ступінь обструкції, стадія нестійкої ремісії. ЛН II. Вкажіть яку фармакотерапію першої лінії можна рекомендувати хворому.

**Ситуаційне завдання 4** Хворому Д. встановлений діагноз ХОЗЛ С, важка ступінь обструкції, стадія нестійкої ремісії. ЛН II. У хворого часті загострення ХОЗЛ, які не контролюються застосуванням сальметеролу (Серевент™ Евохалер™) в дозі 2 інгаляції (2 x 25 мкг сальметеролу) 2 рази на добу. Вкажіть який препарат необхідно додати до фармакотерапії першої лінії.

**Ситуаційне завдання 5** Хворому К., встановлений діагноз ХОЗЛ С, важка ступінь обструкції, стадія нестійкої ремісії. ЛН II. Вкажіть яку фіксовану комбінацію лікарських препаратів можна рекомендувати хворому як фармакотерапію першої лінії.

**Ситуаційне завдання 6** Хворий Н. впродовж 12 років хворіє на ХОЗЛ. Протягом останнього тижня, посилюється кашель, збільшилася кількість харкотиння та змінився характер харкотиння на гнійний. Хворому був встановлений діагноз: ХОЗЛ С, важка ступінь обструкції, інфекційне загострення група А. ЛН II. Вкажіть які препарати першої лінії для прийому всередину рекомендувати додати до базисної фармакотерапії при гнійному загостренні ХОЗЛ.

**Ситуаційне завдання 7** Хворий М. впродовж 10 років хворіє на ХОЗЛ. Протягом останніх двох тижнів значно збільшилася задишка. Був встановлений діагноз: ХОЗЛ С, важка ступінь обструкції, неінфекційне загострення. ЛН II. Вкажіть яку терапію можна рекомендувати хворому для зменшення задишки при тяжкому загостренні ХОЗЛ.

**Ситуаційне завдання 8** Хворому Т. встановлений діагноз ХОЗЛ В, середня ступінь обструкції, стадія нестійкої ремісії. ЛН II. Хворий не може отримувати бронходилататори інгаляційно. Вкажіть яку фармакотерапію можна рекомендувати хворому.

**Ситуаційне завдання 9** Хворому Ю. встановлений діагноз ХОЗЛ С, важка ступінь обструкції, стадія нестійкої ремісії. Хронічний бронхіт. ЛН II. Хворий отримує тіотропію бромід (Спірива) інгаляції 1 раз на добу. Вкажіть який препарат необхідно додати до фармакотерапії (як додатковий засіб для бронходилатуючої терапії) для профілактики загострення хвороби та зниження частоти загострень.

**Ситуаційне завдання 10.** У хворого Т., 22 років, раптово підвищилася температура тіла до 39,1 С, озноб, біль у м'язах, з'явився нежить. Хворому встановлено діагноз гостра респіраторна інфекція. Порекомендуйте препарати для фармакотерапії нежитю.

**Ситуаційне завдання 11.** У хворого Т., 22 років, раптово підвищилася температура тіла до 39,1 С, озноб, біль у горлі, з'явився нежить. Хворому встановлено діагноз гостра респіраторна інфекція. Порекомендуйте препарати симптоматичної фармакотерапії болю у горлі.

**Ситуаційне завдання 12.** У хворого Т., 22 років, раптово підвищилася температура тіла до 39,1 С, озноб, біль у горлі, з'явився нежить. Хворому встановлено діагноз гостра респіраторна інфекція. Порекомендуйте хворому жарознижувальні препарати.

**Ситуаційне завдання 13.** Хворий К., 25 років, захворів раптово, з підвищення температури тіла до 38,8 С, появи сухого кашлю. Встановлено діагноз: Гострий бронхіт. Порекомендуйте хворому препарат для зниження температури тіла.

**Ситуаційне завдання 14.** Хворий К., 25 років, захворів раптово, з підвищення температури тіла, відчуття дряпання у горлі, появи кашлю з відходженням в'язкого мокротиння. Хворому встановлено діагноз: Гострий бронхіт. Порекомендуйте хворому муколітичні препарати.

**Ситуаційне завдання 15.** Хворий К., 25 років, 7 днів отримував терапію з приводу встановленого діагнозу: Гострий бронхіт. Хворий продовжує скаржитися на сухий нападоподібний непродуктивний (без відходження мокротиння) кашель. Порекомендуйте хворому протикашльові препарати центральної дії.

**Ситуаційне завдання 16.** У хворого П., 70 років, який страждає на цукровий діабет II типу, встановлено діагноз: Гострий бронхіт. Хворому призначено симптоматичне лікування (жарознижувальні засоби, муколітичні засоби). Протягом двох днів симптоми не зникають та стан хворого погіршується. Порекомендуйте хворому антибактеріальні засоби.

**Ситуаційне завдання 17.** Хворий К., 35 років, скаржиться на підвищення температури тіла, появи кашлю з мокротинням, що трудно відходить. Хворому встановлено діагноз: Гострий бронхіт. Порекомендуйте хворому препарати для полегшення відходження мокротиння.